PO-ENF-006-00

PO

PROCEDIMENTO

ENFERMAGEM

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRADÉRMICA

1. OBJETIVO

Administração segura de medicamentos através da derme.

2. DEFINIÇÕES

O medicamento é aplicado entre a derme e a epiderme e sofre pouca absorção sistêmica. Por esta via é utilizado pequenos volumes (0,5 ml ou menos), para processos que envolvem reações imunológicas (exemplo: testes de sensibilidade ou alergia e tuberculose), aplicação de vacinas e anestésico local.

3. RESPONSABILIDADES

Elaboração e revisão: Enfª Suéllen Silva, Enfª Tatiane Florentino, Enfª Julia Moscovits, Dr. Murilo Marques.

Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos assistenciais da unidade.

4. PÚBLICO-ALVO

Usuários do SUS.

5. PROCEDIMENTO

5.1. Materiais a serem utilizados

- Bandeja;
- Luvas de procedimento;
- Agulha para aspiração;
- Agulha 13 x 4,5;
- Seringa de 1ml;
- Gaze estéril;
- Álcool 70%;
- Medicamento prescrito;
- Clorexidina alcoólica.

5.2. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

- Realizar a higienização das mãos, conforme a orientação do SCIH;

CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.

- Conferir os nove certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa, registro certo, diluição certa s/n, riscos aos profissionais e riscos aos pacientes;
- Fazer e colocar o rótulo de identificação do medicamento com: nome, dose, horário, via de administração e paciente.
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;
- Fazer a desinfecção no frasco ou ampola com algodão umedecido em clorexidina alcoólica ou álcool 70%.
- Preparar o medicamento utilizando a agulha de aspiração e a seringa de 1 ml;
- Reunir o material a ser colocado na bandeja;
- Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Informar e explicar o procedimento ao paciente;
- Realizar a higienização das mãos, conforme a orientação do SCIH;
- Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Fazer a antissepsia do local com gaze umedecida em álcool 70%;
- Distender a pele do local de aplicação;
- Introduzir o bisel da agulha em um ângulo de 15 graus, quase paralelamente à superfície da pele;
- Injetar lentamente, empurrando o bisel com a mão oposta à que segura a seringa, observar a formação de pápula;
- Retirar a agulha;
- Orientar o paciente para não coçar o local;
- Recolher o material utilizado, deixando a unidade do paciente em ordem;
- Desprezar os resíduos;
- Descartar o material pérfuro em local adequado;
- Retirar a luva de procedimento;

CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.

- Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e realizar a desinfecção com álcool 70%;
- Realizar a higienização das mãos, conforme a orientação do SCIH;
- Checar o horário de administração do medicamento na prescrição médica;
- Fazer anotação de enfermagem se houver intercorrências.

5.3. CUIDADOS RELACIONADOS:

- Checar o medicamento após a sua administração e se não foi administrado circular o horário e anotar o motivo;
- Se o medicamento for dado fora do horário prescrito, checar o novo horário de administração e anotar o motivo;
- Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação e comunicar o enfermeiro responsável e/ou médico;

6. REFERÊNCIAS

BARE, B. G; SUDDARTH, D.S. Brunner – Tratado de Enfermagem Médico – Cirúrgica. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P.A.; PERRY, A.G..Fundamentos de Enfermagem. 7ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2009.

SILVA LD, PEREIRA SEM, MESQUITA AMF. Procedimentos de Enfermagem: Semiotécnica para o cuidado. Rio de Janeiro: Medsi; 2005.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/revisador por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Júlia Moscovits	30.06.2021	Emissão Inicial	Murilo Marques	01.07.2021

CÓPIA CONTROLADA - REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA.