

PROCEDIMENTO OPERACIONAL**ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR****CÓDIGO
PO.ENF.011****REVISÃO: 00
PÁGINA 1/3****1. OBJETIVO**

Padronizar o preparo e administração segura de medicamentos via intramuscular no Hospital de Brotas.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Elaboração e revisão: Enf^a Suellen Silva, Enf^a Tatiane Florentino, Enf^a Julia Moscovits, Enf^a Lailla Farias, Dr. Murilo Marques, Iandira Garrido.

2.2. Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos assistenciais dos serviços geridos pelo INTS.

3. DEFINIÇÕES

É a administração de medicamentos no tecido muscular, devendo-se levar em conta o volume da massa muscular, espessura do tecido adiposo, idade do paciente, irritabilidade da droga e distância em relação a vasos e nervos importantes, na escolha do local para a aplicação.

IM- Intramuscular

4. PÚBLICO-ALVO

Pacientes assistidos nos serviços de saúde geridos pelo INTS.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO/ PROCESSO**5.1. MATERIAL NECESSÁRIO**

- Bandeja;
- Rótulo de identificação;
- Luvas de procedimento;
- Seringa;
- Agulha 40 x 12, 25 x 7, 30x7 ou 30 x 8;
- Medicamento prescrito;
- Gaze estéril;
- Algodão;
- Clorexidina alcoólica ou álcool 70%.

5.2. ETAPAS DO PROCEDIMENTO



PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR

CÓDIGO
PO.ENF.011

REVISÃO: 00
PÁGINA 2/3

- Conferir prescrição;
- Conferir os 11 certos: paciente certo, medicamento certo, hora certa, dose certa, via certa, registro certo, diluição certa s/n, riscos aos profissionais e riscos aos pacientes, abordagem certa, forma farmacêutica certa, monitoramento certo;
- Identificar o medicamento com: nome, dose, horário, via de administração e paciente utilizando o rótulo de identificação;
- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Separar o material necessário;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;
- Reunir material na bandeja previamente limpa com álcool 70%;
- Realizar a higienização das mãos, conforme a orientação do SCIH;
- Fazer a desinfecção no frasco ou ampola com algodão umedecido em clorexidina alcoólica ou álcool 70%.
- Fazer a reconstituição com o líquido recomendado, se necessário;
- Aspirar o conteúdo do frasco com a agulha de aspiração;
- Trocar agulha (30 x 7 ou 30 x 8), utilizando agulha para administração;
- Retirar o ar da seringa;
- Colocar o rótulo de identificação do medicamento na seringa;
- Levar a bandeja até o leito do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- Conferir os rótulos com os dados do paciente (pulseira de identificação e placa beira leito);
- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;
- Expor a área de aplicação e definir o local de administração;
- Palpar o músculo (medicação local);
- Fazer a antisepsia do local;
- Pinçar com os dedos a pele ao redor do local de administração;
- Inserir a agulha da injeção em um ângulo de 90º em relação ao músculo;
- Aspirar lentamente o êmbolo da seringa e certifica-se de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo, observando retorno sanguíneo;
- Injetar lentamente o conteúdo da seringa observando sempre possíveis queixas do paciente;
- Retirar a agulha com a seringa em um movimento rápido;
- Aplicar leve compressão ao local com algodão;
- Recolher o material utilizado e descartar o material no lixo conforme o protocolo de resíduos;
- Desprezar os resíduos comuns e infectante e o material perfurocortante em local apropriado;
- Retirar as luvas de procedimento;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA INTRAMUSCULAR

**CÓDIGO
PO.ENF.011**

**REVISÃO: 00
PÁGINA 3/3**

- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Checar o horário de administração do medicamento na prescrição médica;
- Registrar procedimento realizado na anotação de enfermagem, se houver intercorrência.

OBSERVAÇÕES:

Músculos indicados para a administração e volume permitido em adultos são:

MÚSCULO	VOLUME MÁXIMO
Vaso lateral da coxa	Máximo 04 mL
Região Dorso Glútea (Quadrante Superior Externo)	Máximo 05 mL
Região Vento Glútea	Máximo 04 mL
Deltoide	Máximo 02 mL

6. REFERÊNCIAS

SILVA LD, PEREIRA SEM, MESQUITA AMF. Procedimentos de Enfermagem: Semiotécnica para o cuidado. Rio de Janeiro: Medsj; 2005.

7. CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/ revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Suéllen Silva, Iandira Garrido/ Laila Farias	06/06/2023	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	06/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

Nome
Cargo

Nome
Cargo

9. ANEXO

Não aplicável