

PROCEDIMENTO OPERACIONAL**ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA****CÓDIGO
PO.ENF.014****REVISÃO: 00
PÁGINA 1/4****1. OBJETIVO**

Padronizar o preparo administração segura de medicamentos via subcutânea no Hospital de Brotas.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Elaboração e revisão: Enf^a Suéllen Silva, Enf^a Tatiane Florentino, Enf^a Julia Moscovits, Enf^a Laila Farias, Dr. Murilo Marques, Iandira Garrido.

2.2. Execução: Todos os profissionais de enfermagem envolvidos nos processos assistenciais dos serviços geridos pelo INTS.

3. DEFINIÇÕES

É a administração de medicamento no tecido subcutâneo. Pode ser realizada em várias regiões do corpo, em que haja camada substancial de tecido adiposo.

4. PÚBLICO-ALVO

Pacientes assistidos nos serviços de saúde geridos pelo INTS.

5. PROCEDIMENTO/ PROCESSO**5.1. RECURSOS/ MATERIAIS UTILIZADOS**

Bandeja;
Rótulo de identificação;
EPI's (Luva de procedimento, óculos de proteção);
Seringa descartável 1 ml;
Agulha descartável 1,20 x 25 - Para de aspiração do medicamento;
Agulha 13 x 4.5 para administração do medicamento;
Algodão;
Medicamento prescrito;
Clorexidina alcoólica ou álcool 70%.

5.2. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO

- Conferir prescrição
- Conferir os onze certos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa, registro certo, diluição certa s/n, riscos aos profissionais e riscos ao paciente, abordagem certa, forma farmacêutica certa, monitoramento certo;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA

CÓDIGO
PO.ENF.014

REVISÃO: 00

PÁGINA 2/4

- Identificar o medicamento com: nome, dose, horário, via de administração e paciente, utilizando o rótulo de identificação;
- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%;
- Reunir o material a ser utilizado na bandeja;
- Preparar o medicamento utilizando a agulha de aspiração (1,2x25) e a seringa de 1 ml;
- Retirar a agulha de aspiração e inserir a agulha 13 x 4,5 mm na seringa;
- Aplicar o rótulo de identificação do medicamento;
- Levar a bandeja até o leito do paciente;
- Identificar-se e explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- Conferir o rótulo com os dados do paciente (pulseira de identificação e placa beira leito);
- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Posicionar o paciente de forma adequada ao procedimento;
- Fazer a antisepsia da pele no local a ser administrado o medicamento subcutâneo;
- Pinçar com os dedos a pele do local de administração (correta posição das mãos no instante de aplicar: a seringa deve estar posicionada entre o polegar e o indicador da mão não-dominante);
- Inserir em único movimento a agulha 13x4,5mm no tecido subcutâneo em um ângulo de 90º com a seringa;
- Retirar a mão não- dominante da prega cutânea;
- Aspirar tracionando o êmbolo com a mão que fixava a prega cutânea (exceto nos medicamentos que já vêm preparados para administração), observando a possível entrada de sangue na seringa (em caso de presença de sangue, retirar a agulha com a seringa);
- Injetar lentamente o medicamento com a mão oposta que segura a seringa (soltar a prega do tecido);
- Retirar a agulha e a seringa em um movimento rápido;
- Aplicar leve compressão ao local com gaze;
- Recolher o material utilizado, deixando a unidade do paciente em ordem;
- Desprezar os resíduos conforme protocolo de resíduos;
- Descartar o material perfurocortante no coletor de material perfurocortantes (sem desconectar a agulha da seringa e sem reencapá-la);
- Retirar a luva de procedimento;
- Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha ou realizar a desinfecção com álcool a 70%;
- Realizar a higienização das mãos, conforme protocolo da instituição;
- Checar o horário da administração do medicamento na prescrição médica;
- Fazer anotação de enfermagem em prontuário, se houver intercorrências.

OBSERVAÇÕES:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA

**CÓDIGO
PO.ENF.014**

REVISÃO: 00

PÁGINA 3/4

- Checar o medicamento após a sua administração e se não foi administrado circular o horário e anotar a justificativa;
- Se o medicamento for dado fora do horário prescrito, solicitar ao enfermeiro o reaprazamento, checar o novo horário de administração e anotar o motivo;
- Registrar qualquer tipo de reação que o paciente possa ter após receber a medicação e comunicar ao enfermeiro responsável e/ou o médico;
- Administrar um volume máximo entre 0,5 ml e 1 ml (o tecido subcutâneo é extremamente sensível a soluções irritantes e grandes volumes de medicamento);
- Locais mais indicados para aplicação de medicamentos por via subcutânea são: deltoide, face externa do braço, face externa da coxa, parede abdominal e região escapular;
- Introduzir a agulha em ângulo de 90° quando hipodérmica ou 45° quando agulhas comuns ou em crianças;
- Após aplicação de insulina ou heparina, o local não deve ser massageado;
- Realizar rodízio nos locais de aplicação e analisar nos locais presença de Lipodistrofia;
- Não reencapar a agulha.

6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERÊNCIAS

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos da Enfermagem. 7ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2009

KOCH. R.M. et. Al. Técnicas básicas de enfermagem. 22ª edição. Curitiba: Século XXI Livros, 2004

SILVA LD, PEREIRA SRM, MESQUITA AMF. Procedimentos de enfermagem: Semiotécnica para o cuidado. Rio de Janeiro: Medsi; 2005

NETTINA SM. Prática de enfermagem. 8ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007

7 CONTROLE DE REGISTRO

Não aplicável

8 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Elaborado/ revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Suellen Silva, landira Garrido/ Lailla Farias	06/06/2023	Emissão inicial	Tatiane Florentino e Júlia Moscovits	06/06/2023

Elaborado por:

Aprovador por:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA

CÓDIGO
PO.ENF.014

REVISÃO: 00

PÁGINA 4/4

Nome

Cargo

Nome

Cargo

9 ANEXO

Não aplicável.